


CLAMIDIA

¿QUÉ ES?

La clamidia es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria llamada *Chlamydia trachomatis*.

SITUACIÓN DE LA INFECCIÓN



Datos obtenidos de Red Alerta AÑOS 2018/2022

En el año 2021 y 2022 se ve una tendencia al alza del número de casos.

EDAD MEDIA:
HOMBRES 31 AÑOS
MUJERES 28 AÑOS

Los grupos de edad que más crecimiento relativo han experimentado en estos últimos años han sido el de 50-54 años y el de 55-64.

FACTOR DE RIESGO:
Cambios de pareja sin protección.
Más del 70% de mujeres y 50% de hombres no presenta síntomas.


¿CÓMO SE MANIFIESTA?

Cervicitis

- Ojo inflamado.
- Dolor al orinar.
- Sangrado después de las relaciones sexuales.
- Sangrado entre reglas.
- Dolor o molestia en la parte baja del abdomen.

Uretritis

- Ojo inflamado.
- Dolor al orinar.
- Secreción, ardor y picazón alrededor del pene.
- Dolor e hinchazón alrededor de los testículos.
- Dolor o sangrado rectal.



Conjuntivitis.
Neumonía neonatal.
RECIENTES NACIDOS

¿CÓMO SE CONTRAEN?


- Sexo sin preservativo vía oral, vaginal o anal, con una persona que tiene la infección.
- Transmisión vertical en el canal del parto, provocando infección ocular o infección pulmonar al recién nacido

¿CÓMO SE PREVIENE?

- TENER SEXO CON PROTECCIÓN**
Uso correcto del preservativo sea sexo oral, vaginal o anal. Y/o barrera de latex, otros métodos barrera.
- Notificar la enfermedad a sus **contactos sexuales.**

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Mediante una muestra de orina, anal, exudado nasofaríngeo o conjuntival.



SI TENGO CLAMIDIA

- Su contacto también puede tenerlo.
- Comunicar a todos sus contactos sexuales conocidos para que se hagan una prueba y reciban tratamiento si lo necesitan.
- No mantener relaciones sexuales, hasta confirmar la curación.
- Despistaje de otras ITS (Infecciones de transmisión sexual)

¿QUIÉNES SON MIS CONTACTOS ESTRECHOS?

Desde **28 días** previos al inicio de síntomas.

Período de incubación **7/14 días.**

CONTROL/ CURACIÓN

VISITA DE CONTROL

Prueba de curación sólo en embarazadas o persistencia de síntomas.

TRATAMIENTO

ANTIBIÓTICO

DOXICICLINA

AZITROMIZINA,
NO ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN,
SALVO EN EMBARAZADAS.

Si no se trata puede provocar enfermedad grave. En el caso de la mujer enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, embarazos ectópicos. Menos frecuentemente puede causar, artritis, Síndrome de Reiter e inflamación ocular.

Aunque se haya tenido una vez, **se puede volver a infectar.**

FUENTES:

RED ALERTA: RED DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ANDALUCÍA. Monografía Vol. 26, Nº 10 Diciembre de 2021

PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE INFECCIÓN POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Consejería de Salud y Consumo

Redacción y diseño: AGS Campo de Gibraltar Este y Oeste
UGC Salud Pública, Epidemiología y Vigilancia de la Salud



EL USO DEL PRESERVATIVO EN LAS RELACIONES SEXUALES SEAN ANALES, ORALES Y VAGINALES PREVIENE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

“PROTEGERSE ES PROTEGER”