

VPH

VIRUS PAPILOMA HUMANO EN MUJERES


¿Qué es?

Es un virus que infecta la > 80% de las personas en algún momento de la vida por transmisión sexual. Pueden causar verrugas genitales y no genitales.

SITUACIÓN DE LA INFECCIÓN EN ESPAÑA

Actualmente es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial por encima de la sífilis, gonorrea, VIH y clamidia.


En España, se estima que hay 18 millones de mujeres sexualmente activas, mayores de 18 años.



- 2 millones son portadoras de VPH y aproximadamente 400.000 presentan alteraciones en citología.
- Cada año en nuestro país se diagnostican 1.942 cánceres de cuello de útero y por esta causa fallecen 825 mujeres.



¿CÓMO SE MANIFIESTA?



- AUMENTO DEL FLUJO VAGINAL
- SANGRADO VAGINAL ANORMAL
- AUMENTO DE HUMEDAD
- APARICIÓN DE VERRUGAS ANO GENITALES
- CAMBIOS PRE- CANCEROSOS
- CÁNCER
- EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ASINTOMÁTICO

HAY MÁS DE 100 TIPOS

30 CON RIESGO DE PRODUCIR CÁNCER

HAY UNA BUENA NOTICIA "SE PUEDE PREVENIR"



¿CÓMO SE TRANSMITE?



Mediante el contacto sexual:

- Penetración y con el contacto piel con piel o sexo oral.
- Su transmisión es "silenciosa" en la mayoría de los casos las personas que transmiten el VPH no tienen ningún síntoma ni lesión.

¿Cómo se diagnostica?

En mujer mediante una citología. También mediante el cribado de cáncer de cuello de útero, toma muestras para detectar posibles lesiones pre cancerosas antes de desarrollar cáncer.

¿Qué provoca?

Los serotipos 16 Y 18 si persiste en la zona genital, puede producir lesiones pre cancerosas si no se detectan y se tratan pueden evolucionar hasta cáncer de cuello de útero



PRESERVATIVO

PREVENCIÓN



VACUNACIÓN

- Reduce el riesgo de contagio, no completamente ya que el virus puede encontrarse en zona genital y anal que no puede proteger el preservativo.

- Esta vacuna es efectiva para prevenir la infección y sus consecuencias, así como las verrugas genitales y lesiones precancerosas.

PAUTA DE VACUNACIÓN

POBLACIÓN DIANA

- Chicas y chicos a los **12 años**.
- Chicas a los **13 y 18 años** si le falta alguna dosis o no están vacunadas

Resto de población

Hombres y mujeres que cumplan criterios de riesgo: Prostitución, HSH*, VIH, etc. hasta los 26 años. Mujeres conizadas.

*Hombre que tiene sexo con hombre

FUENTES:

[HTTPS://WWW.AEPCC.ORG/](https://www.aepcc.org/)

[NFECCION-POR-EL-VPH/](https://www.aepcc.org/)

[HTTPS://WWW.ANDAVAC.ES/](https://www.andavac.es/)

[VACUNACION-PAPILOMA-EN-ANDALUCIA](https://www.andavac.es/)

[HTTPS://WWW.CDC.GOV/](https://www.cdc.gov/)

[HPV/PARENTS/A-BOUT-HPV-SP.HTML](https://www.cdc.gov/)



“PROTEGERSE ES PROTEGER”



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Consejería de Salud y Consumo

Redacción y diseño: AGS Campo de Gibraltar Este y Oeste
UGC Salud Pública, Epidemiología y Vigilancia de la Salud